



O.J.D.: 24148
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 369 €
Área: 208 cm2 - 18%

REDACCIÓN
Madrid

Alcón lanzó el colirio Nevanac contra el riesgo de Edema Macular Cistoide

Nevanac (nepafenaco) colirio en suspensión, es el primer fármaco Antiinflamatorio No Esteroideo (AINE), indicado para la reducción del riesgo de Edema Macular Cistoide (engrosamiento de la mácula, la parte central de la retina en la parte posterior del ojo y que puede causar ceguera) en personas diabéticas después de haberse sometido a una cirugía de catarata. Nevanac también está indicado en la prevención y trata-

miento del dolor y la inflamación asociados a la cirugía de catarata, demostrando un control antiinflamatorio eficaz. El nepafenaco, principio activo de Nevanac, es un profármaco del amfenaco, es decir, una vez en el ojo, el nepafenaco se convierte en amfenaco. El amfenaco es un AINE que actúa bloqueando la enzima llamada

ciclooxigenasa, productora de prostaglandinas, sustancias que intervienen en el proceso inflamatorio. Al reducir la producción de prostaglandinas en el ojo, Nevanac puede reducir las complicaciones causadas por la cirugía ocular, como la inflamación y el dolor.

Gracias a su estructura de profármaco, Nevanac tiene una

mayor penetración a través de la córnea y se distribuye dentro de los segmentos anterior y posterior con una alta biodisponibilidad, hidrolizándose de nepafenaco a amfenaco en los tejidos diana, sobre todo en el segmento posterior del ojo.

La naturaleza de pro-fármaco de Nevanac, además, reduce el

riesgo de complicaciones de la superficie ocular porque el fármaco no se acumula en la córnea, lo que le confiere un excelente perfil de seguridad.

En el informe de Evaluación Pública Europea (EPAR) de la European Medicines Agency, se señala, entre otros datos, que en pacientes con diabetes, Nevanac fue más eficaz que el placebo para reducir el riesgo de edema macular. Solo el 3,2 por ciento de los pacientes que fueron tratados con Nevanac desarrolló edema macular.