



TEST DE GLUCOSA. Una mujer se somete a la prueba para averiguar si es diabética. / EFE

Las farmacias analizarán a 220.000 murcianos para detectar la diabetes

Más de 200 boticas participan en un programa gratuito de diagnóstico para evitar problemas como amputaciones

PAZ GÓMEZ MURCIA

Unas 220 farmacias de la Región participarán en un original estudio para localizar a diabéticos tipo 2 que aún desconocen que lo son. El Colegio de Farmacéuticos de Murcia ha firmado un convenio con la Consejería de Sanidad y la Sociedad Murciana de Endocrinología para detectar en las boticas a los diabéticos ocultos.

A priori, Sanidad calcula que más de 100.000 murcianos padecen diabetes y la mitad no lo saben. La tipo 2 hace referencia a los enfermos que no son dependientes de la insulina porque sus páncreas generan esta sustancia, pero no actúa.

Prudencio Rosique, presidente del Colegio de Farmacéuticos, pre-

cisó que en las oficinas se realizará el test a las personas que al rellenar una encuesta se ajusten al perfil de riesgo (mayor de 45 años, obesos). En total, se espera llegar a 220.000 murcianos. Si la prueba, totalmente gratuita, revela unos valores altos, el farmacéutico derivará al paciente a su médico.

Los diagnósticos de estas personas se reenviarán al Colegio para que Isabel Tovar, jefa de hormonas en La Arrixaca, y su equipo elaboren un estudio sobre la prevalencia real en la población.

Tovar precisó que «el objetivo primero es reducir los riesgos asociados que sufren los diabéticos gracias a una detección precoz. La diabetes es responsable de la mitad de las insuficiencias renales, es la

EN QUÉ CONSISTE:

- ▶ **Las 220 farmacias** tendrán dípticos para entregar a los pacientes y un test de riesgo.
- ▶ **Si el usuario se ajusta al perfil de riesgo**, se le realizan los tests de glucosa en sangre. En caso de dar un nivel alto, se le enviará a su médico de cabecera.
- ▶ **El contenedor desechable**, los analizadores, pinchadores, lancetas de punción capilar y tiras reactivas han sido proporcionadas por el Laboratorio Menarini Diagnostics.

segunda causa de ceguera y origina el 50% de las amputaciones de miembros inferiores». El consejero de Sanidad apuntó que su departamento está efectuando un estudio epidemiológico paralelo.