




Pioglitazona frena la evolución de la aterosclerosis en diabéticos tipo 2

Pioglitazona (Actos, de Takeda y Lilly) usado en diabéticos de tipo 2 frena la evolución de la aterosclerosis medida por el grosor de la capa íntima-media carotídea (CIMT), según los resultados del ensayo clínico *Chicago*, que son parte de una reciente presentación en el Congreso Anual de la Asociación Americana del Corazón (AHA), celebrado en Chicago en 2006. "El estudio *Chicago* (aleatorizado, multicéntrico, de dieciocho meses, que incluyó a 462 pacientes con diabetes tipo 2) es otra interesante pieza del puzzle, que se añade a la comprensión de cómo piogli-



THEODORE MAZZONE, de la Universidad de Illinois.

tazona puede aportar beneficios más allá del control glucémico", explicó Theodore Mazzone, profesor de Medicina y Director del Área de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo en la Universidad de Illinois, en Chicago. Según Mazzone, "aunque son necesarios más estudios para comprobar cómo los descensos en el CIMT con pioglitazona pueden prevenir episodios cardiovasculares (CV), estos nuevos acercamientos para redirigir los factores de riesgo CV en diabetes son críticos".

Texto: REDACCIÓN

Foto: UNIVERSIDAD DE ILLINOIS