

## **Siete millones de nuevos casos de diabetes tipo 2 se diagnostican cada año**

Los expertos calculan que durante este año se contabilizaran 246 millones de diabéticos tipo 2 en el mundo. La cifra se disparará hasta alcanzar 380 millones en el año 2050, según auguraron en el Primer Congreso Mundial sobre Manejo de la Diabetes tipo 2, celebrado en Nueva York.

27/10/2008

Anualmente fallecen cuatro millones de personas víctimas de la diabetes tipo 2. Para vencerla, en pacientes con obesidad mórbida deberán someterse a cirugía bariátrica. La reducción quirúrgica de masa corporal es una opción que es capaz de disminuir la medicación en aquellos pacientes diabéticos que lo son por el exceso de peso. Esta operación se ejecuta con la pretensión de curar el síndrome metabólico, donde la diabetes tipo 2 es el principal factor predictivo de la aparición de la enfermedad cardiovascular.

La intervención es efectiva en pacientes obesos con un índice de masa corporal (IMC) entre 35 y 40. Únicamente entre el 8 y el 10 por ciento que padecen la patología sufre obesidad en grado uno y otro 10-15 por ciento obesidad en grado dos. Por lo que "los pacientes del grado uno que tienen una mala evolución de la enfermedad son candidatos a esta cirugía, y los de grado dos deberán ser sometidos a un seguimiento por parte de los especialistas" advierte el protocolo que se ha establecido en el congreso.

Por el momento los resultados a tres y cuatro años corroboran que la obesidad complica la diabetes y acelera su aparición. La cirugía bariátrica puede realizarse con técnicas restrictivas, mediante el bypass gástrico o con técnicas malabsortivas.