O.J.D.: 11835
E.G.M.: No hay datos
Tarifa (€): 192

CORREO MEDICO
EDICIÓN SEMANAL DE DIARIO MÉDICO

Fecha: 11/10/2010
Sección: MEDICINA
Páginas: 15

ENDOCRINOLOGÍA

Más riesgo vascular con hipoglucemia grave en diabetes 2

CM

La hipoglucemia grave puede ser un marcador de riesgo de peor pronóstico en diabéticos tipo 2 tratados con reducción intensiva de la glucosa, según se publica en *The New England Journal of Medicine*.

Los datos confirman la hipótesis. Los participantes fueron examinados para comprobar la asociación entre la hipoglucemia grave y los riesgos macro y microvasculares. Los autores concluyen que la asociación existe, y que el riesgo resultados clínicos adversos es mayor. Pero la hipoglucemia grave puede no estar relacionada y ser sólo un marcador de vulnerabilidad.

Simon Heller, de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, y coordinador del estudio, señala que en una media de seguimiento de cinco años 231 pacientes (un 2,1 por ciento de los 11.140) sufrieron al menos un episodio de hipoglucemia grave. De este grupo, 150 se sometieron a un control intensivo de la glucosa, mientras que 81 se sometieron a un control estándar. El tiempo entre la aparición de la hipoglucemia y el evento cardiovascular, o el fallecimiento, se sitúo entre los 0,99 y los 1,56 años, según el rango intercuartil. La hipoglucemia grave se asoció con un aumento significativo en la aparición de eventos macrovasculares (2,8 8, según la tasa de riesgo utilizada).

■ *(N Engl J Med 2010; 363:1410-1418).*