



Hiperglucemia y diabetes en pacientes no críticos con NP

R.C.
Madrid

Si bien en los últimos años se ha avanzado bastante en el conocimiento de la hiperglucemia en los pacientes críticos que precisan de nutrición parenteral (NP), la investigación de esta problemática en pacientes no críticos que necesitan de este soporte nutricional especializado no ha sido tan extensa. De ahí la importancia del estudio multicéntrico "Prevalencia de hiperglucemia y diabetes en pacientes no críticos con nutrición parenteral", que está llevando a cabo el grupo de estudio para la hiperglucemia en NP.

Coordinado por Gabriel Oliveira y María José Tapia, los resultados de este estudio, presentado en numerosos congresos tanto nacionales como internacionales, han permitido, además de establecer la prevalencia de hiperglucemia y diabetes tipo 2, conocer "el impacto sobre la morbimorta-

lidad en estos pacientes y cuáles son las terapéuticas al uso y el estado nutricional de estos pacientes en el momento de indicar la NP", explica Julia Álvarez, coordinadora del área de investigación en nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), en el que se enmarca este grupo de trabajo.

Además, existe una segunda línea de investigación, coordinada por Lucía Laborda y Miguel León, que intenta establecer los criterios para definir el estreñimiento y la diarrea asociada a la nutrición enteral (NE). Actualmente, los investigadores, que esperan poder presentar resultados en el próximo congreso de la SEEN, se encuentran recopilando datos sobre la interpretación de determinados signos clínicos relacionados con las alteraciones del tránsito intestinal en pacientes con NE a partir de una serie de encuestas remitidas a una muestra representativa de hospitales españoles.